

СТРОМАЛЬНЫЕ И СОСУДИСТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗОНЕ ОПЕРАЦИИ И ОБЛУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ РЕЦИДИВА КАРЦИНОМЫ ПОЛОСТИ РТА

Хамидов Жахонгир Джамшиедович

Самаркандский государственный медицинский университет

Резюме. Рецидив карциномы полости рта после хирургического и лучевого лечения представляет собой одну из наиболее сложных проблем современной онкоморфологии. Высокая частота локорегионарных рецидивов, достигающая 25–50 процентов, и неблагоприятный прогноз при их развитии определяют необходимость совершенствования методов ранней диагностики. Особую трудность создаёт то обстоятельство, что рецидивирующая опухоль развивается на фоне выраженных постлучевых и постхирургических изменений тканей.

Ключевые слова: дифференциальная диагностика, стромальные и сосудистые изменения, карцинома, постлучевые изменения.

Основная часть. В зоне ранее проведённого лечения формируются фиброз и склероз стромы, нарушения микроциркуляции, утолщение стенок сосудов, хроническое воспаление и рубцовая деформация [3]. Эти процессы существенно изменяют морфологическую картину и затрудняют выявление опухолевых комплексов. Стромальные изменения после лучевой терапии и хирургического вмешательства носят сложный и многокомпонентный характер. Наблюдается увеличение содержания коллагеновых волокон, нарушение их архитектоники, появление гиалинизированных участков, снижение клеточности стромы [2]. Одновременно происходят выраженные изменения сосудистого русла: облитерация мелких сосудов, утолщение стенок, нарушения проницаемости, появление атипичных эндотелиальных клеток [1]. На этом фоне

рецидивирующая карцинома часто растёт в виде мелких тяжей, отдельных клеток или небольших комплексов, которые легко маскируются фиброзной тканью. В результате возникает высокий риск как ложноположительной, так и ложноотрицательной диагностики. Дифференциальная диагностика между десмопластической реакцией, характерной для инвазивного роста опухоли, и посттерапевтическим фиброзом на основании только рутинного гистологического исследования часто оказывается затруднительной. Для повышения точности диагностики необходимо детальное изучение количественных и качественных характеристик стромы, состояния микроциркуляторного русла, плотности сосудистой сети и их взаимосвязи с опухолевым микроокружением. Важную роль в решении этой задачи играет иммуногистохимическое исследование с использованием маркеров ангиогенеза, пролиферации и иммунного статуса.

Целью настоящей работы является сравнительный морфологический и иммуногистохимический анализ стромальных и сосудистых изменений при рецидивной карциноме полости рта и при постлучевых, постхирургических реактивных процессах без рецидива.

Материалы и методы исследования. В исследование планируется включить материал 120 пациентов. Методы включают светооптическую морфологию с применением специальных окрасок для оценки соединительной ткани, иммуногистохимическое исследование с использованием маркеров ангиогенеза (CD34, VEGF), пролиферации (Ki-67), PD-L1 и p53, а также оценку лабораторных показателей системного воспаления. Особое внимание будет уделено количественной характеристике выраженности фиброза, оценке плотности и строения сосудистой сети, изучению взаимосвязи стромальных изменений с экспрессией маркеров микроокружения опухоли.

Результаты исследования. Комплексный подход позволит выявить наиболее характерные стромальные и сосудистые признаки, имеющие дифференциально-диагностическое значение. Ожидается, что

результаты исследования будут способствовать разработке объективных морфологических критериев разграничения рецидива карциномы полости рта и посттерапевтических изменений. Внедрение таких критериев в практику патологоанатомических отделений повысит достоверность диагностики, снизит частоту ошибок и позволит более своевременно определять тактику дальнейшего лечения пациентов.

Закключение. В ходе изучения данной проблемы можно определить основные критерии диагностики, которые можно использовать для разработки алгоритма.

Литература

1. Кропотов М.А., Федотенко С.П., Жарков О.А., Ткачев С.И. Хирургическое лечение больных раком полости рта после ранее проведённой лучевой терапии.
2. Asikainen P.J., Kullaa A.M. et al. Radiation-induced changes in the microstructure of epithelial cells of the oral mucosa. Journal of Oral Pathology & Medicine. 2017.
3. Метелица К.И., Манак Т.Н. Осложнения лучевой терапии в полости рта. 2021.
4. Kimura T.C., Lavareze L. et al. Radiation-induced changes in oral mucosa tissues – Report of seven cases. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology. 2024.