

**ЭНДОМЕТРИОЗ БИЛАН БОҒЛИҚ ТУХУМДОН ЗАХИРАСИНИНГ
КАМАЙИШИДА ФЕРТИЛЛИКНИ САҚЛАШ СТРАТЕГИЯЛАРИГА
ЗАМОНАВИЙ НИГОХ
(Адабиетлар шарҳи)**

Қурбонова Гавҳар Фарход қизи

Сурхондарё вилояти тиббиёт техникуми

Аннотация. Эндометриоз репродуктив ёшдаги аёлларда учрайдиган сурункали, қайталанувчи ва кўп омилли гинекологик касаллик бўлиб, унинг клиник кечиши оғриқ синдроми, ҳайз циклининг бузилиши, эндометриоид тухумдон кисталари ва бепуштлиқ билан намоён бўлиши мумкин. Эндометриознинг репродуктив функцияга таъсир этувчи муҳим жиҳатларидан бири тухумдон захирасининг пасайиши ҳисобланади. Бу жараён касалликнинг ўзига хос патофизиологик механизмлари билан бир қаторда эндометриомани жарроҳлик йўли билан даволаш натижасида ҳам кучайиши мумкин. Айниқса, икки томонлама эндометриома, қайталанувчи эндометриоз ва аввалги тухумдон операциялари мавжуд беморларда репродуктив потенциални сақлаш масаласи алоҳида клиник аҳамият касб этади. Сўнгги йилларда эндометриозда тухумдон захирасини баҳолаш учун антимюллер гормони (АМН) ва антрал фолликулалар сони (АФС)дан фойдаланиш кенг тарқалди. Шу билан бирга, эндометриомани даволашда классик кистэктомиядан ташқари лазер абляцияси, гемостатик воситалардан фойдаланиш, тикиш орқали гемостаз ва бошқа орган-сақловчи технологиялар ўрганилмоқда. 2024–2026 йилларда эълон қилинган мета-таҳлиллар айрим кам инвазив жарроҳлик усуллари операциядан кейинги АМН пасайишини камайтириши мумкинлигини кўрсатган бўлса-да, рецидив ва узоқ муддатли репродуктив натижалар бўйича далиллар ҳали ҳам тўлиқ эмас. Ушбу мақолада эндометриозда тухумдон захираси камайишининг патогенетик механизмлари, унинг клиник аҳамияти, АМН ва АФСнинг

диагностик роли, жаррохлик даволашнинг репродуктив потенциалга таъсири, замонавий гормонал терапия, ёрдамчи репродуктив технологиялар ва фертилликни сақлаш усуллари бўйича замонавий адабиётлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: эндометриоз, эндометриома, тухумдон захираси, антимюллер гормон, АМН, AFC, бепуштлик, кистэктомия, лазер абляция, гормонал терапия, IVF, ICSI, ооцит криоконсервацияси, фертилликни сақлаш.

Кириш. Эндометриоз замонавий гинекологияда репродуктив саломатликка сезиларли таъсир кўрсатувчи касалликлардан бири ҳисобланади. Касаллик бачадон ички қаватига ўхшаш эндометриал без ва строманинг бачадон бўшлиғидан ташқарида жойлашиши, эстрогенга боғлиқ фаоллик ва сурункали яллиғланиш жараёни билан тавсифланади. Эндометриознинг клиник фенотиби турлича бўлиб, юзаки перитонеал ўчоқлардан тортиб чуқур инфильтратив шакллар ва тухумдон эндометриомаларигача бўлган кўринишларни қамраб олади.

Zondervan ва ҳаммуаллифлар эндометриозни фақат анатомик ўчоқлар билан чекланадиган касаллик эмас, балки оғриқ ва репродуктив дисфункция билан кечувчи мураккаб сурункали ҳолат сифатида таърифлайдилар. Уларнинг фикрича, касалликнинг клиник оқибатлари ўчоқларнинг анатомик тарқалиши билан ҳар доим ҳам тўғридан-тўғри мутаносиб эмас. Шунинг учун эндометриозли беморни бошқаришда фақат морфологик ўзгаришлар эмас, балки беморнинг ёши, оғриқ синдроми, репродуктив режалари ва тухумдон захираси ҳам ҳисобга олиниши керак.

Эндометриозда репродуктив функциянинг пасайиши кўп омилли характерга эга. Бунда кичик чанок анатомиясининг бузилиши, битишмалар, бачадон найларининг функционал ўзгаришлари, яллиғланиш медиаторларининг кўпайиши, ооцит ва эмбрион сифатига таъсир этувчи муҳитнинг шаклланиши ҳамда тухумдон захирасининг камайиши муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, эндометриоид тухумдон кистаси мавжуд

беморларда тухумдоннинг функционал тўқимаси зарарланиши мумкин. Бундан ташқари, эндометриомани жарроҳлик йўли билан даволашнинг ўзи ҳам тухумдон захирасига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли ҳозирги босқичда эндометриозни даволашнинг асосий мақсади фақат эндометриоз ўчоқларини бартараф этиш эмас, балки беморнинг узок муддатли репродуктив потенциалини максимал даражада сақлашдан иборат.

Эндометриознинг тухумдон захирасига таъсир механизмлари.

Тухумдон захираси тухумдонда мавжуд бўлган фолликулалар миқдори ва уларнинг репродуктив потенциалини ифодаловчи тушунча ҳисобланади. Клиник амалиётда уни баҳолаш учун асосан АМН даражаси ва AFC кўрсаткичларидан фойдаланилади. АМН гранулёз хужайралари томонидан ишлаб чиқарилади ва ўсишнинг дастлабки босқичидаги фолликулалар миқдорини акс эттиради. Шу сабабли АМН репродуктив ёшдаги аёлларда тухумдон захирасининг нисбатан барқарор маркери сифатида қаралади. AFC эса трансвагинал ультратовуш текшируви орқали антрал фолликулаларни санашга асосланади.

Эндометриозда тухумдон захирасининг пасайиши бир нечта патогенетик механизмлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Улар орасида сурункали яллиғланиш, оксидловчи стресс, темирга бой эндометриома суюқлигининг фолликуляр тўқимага таъсири, локал цитокинлар ва бошқа яллиғланиш медиаторларининг кўпайиши муҳим ўрин тутди. Эндометриома ичидаги гемолиз маҳсулотлари ва темирнинг тўпланиши оксидловчи стрессни кучайтириб, атрофдаги тухумдон тўқимасига таъсир қилиши мумкин. Бу жараён фолликулаларнинг нормал ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши эҳтимолини оширади. Шунингдек, эндометриомада фиброз ва стромал ремоделланиш жараёнлари кузатилиши мумкин. Натижада нормал тухумдон архитектураси ўзгариб, фолликуляр муҳитнинг физиологик хусусиятлари бузилади. Бу нуқтаи назардан эндометриозда тухумдон захирасининг пасайиши фақат операциянинг асорати эмас, балки касалликнинг ўзига хос патофизиологияси билан ҳам

боғлиқ жараён сифатида қаралиши лозим.

АМН ва АФСнинг клиник аҳамияти. АМН ва АФС эндометриозли беморларда репродуктив стратегияни белгилашда муҳим инструментлардан ҳисобланади. Бироқ уларнинг ҳар бири тухумдон фаолиятининг турли жиҳатларини акс эттиради. АМН даражасининг пасайиши тухумдон захираси камайганлигини кўрсатиши мумкин, аммо у табиий ҳомиладорлик эҳтимолини мустақил равишда аниқ белгилаб бермайди. Шунинг учун АМН натижасини беморнинг ёши, эндометриознинг шакли, аввалги операциялар, АФС ва бошқа репродуктив омиллар билан биргаликда талқин қилиш зарур [1,12].

АФС ҳам шунга ўхшаш аҳамиятга эга. Эндометриома мавжуд тухумдонда антрал фолликулалар сони камайиши мумкин. Айниқса, икки томонлама эндометриома ёки такрорий операциялардан кейин бу ўзгаришлар янада яққоллашиши мумкин. ESHREнинг 2022 йилги қўлланмасида оғир тухумдон эндометриози, айниқса икки томонлама эндометриомалар, эрта тухумдон етишмовчилиги ва паст АМН билан боғлиқ юқори хавф гуруҳи сифатида қаралади. Шу билан бирга, фертиликни сақлашнинг барча беморлар учун бир хил даражада зарурлиги бўйича далиллар етарли эмаслиги таъкидланган.

Шу сабабли АМН ва АФСни бир марта эмас, балки клиник вазиятга қараб динамикада баҳолаш эндометриозли беморларда репродуктив стратегияни танлашда муҳим бўлиши мумкин [2,13,14].

Жарроҳлик даволаш ва тухумдон захираси. Эндометриомани жарроҳлик йўли билан даволаш узок вақт давомида стандарт ёндашувлардан бири бўлиб келган. Классик эндометриомэктомия, яъни кистэктомияда киста капсуласини ажратиб олиш асосий усуллардан бири ҳисобланади. Бироқ операция вақтида эндометриома капсуласи билан бирга функционал тухумдон тўқимасининг маълум қисми ҳам зарарланиши мумкин. Электрокоагуляциядан фойдаланиш эса термик таъсир туфайли қўшимча тўқима зарарланишига олиб келиши эҳтимолига эга.

Paik va Jee (2024) tomonidan ўtkazilgan yangilangan meta-ta'hlilда 6 та рандомизацияланган клиник тадқиқот ва 5 та проспектив когорт тадқиқоти таҳлил қилинган. Муаллифлар абляциядан кейин АМН пасайиши ўртача $-0,40$, кистэктомиядан кейин эса $-1,08$ эканини билдирганлар. Абляция гуруҳида операциядан кейинги АМН статистик жиҳатдан юқорироқ сақланган, бироқ рецидив хавфи абляциядан кейин юқорироқ бўлган. Ҳомиладорлик кўрсаткичлари эса икки усул ўртасида ишончли фарқ қилмаган. Бу натижалар эндометриомани даволашда «касалликни тўлиқ бартараф этиш» ва «тухумдон тўқимасини асраш» ўртасидаги мувозанатни таъминлаш зарурлигини кўрсатади. 2022 йилги meta-ta'hlilда ҳам кистэктомиядан кейин АМН ва AFC пасайиши абляцияга нисбатан яққолроқ бўлиши мумкинлиги кўрсатилган. Бироқ ҳар икки усул ҳам тухумдон захирасига маълум даражада таъсир қилиши мумкин. Шунинг учун жарроҳлик техникасини танлашда фақат рецидивнинг олдини олиш эмас, балки беморнинг келажақдаги репродуктив режаси ҳам ҳисобга олиниши керак [3,9,11].

Жарроҳликда гемостаз усулининг аҳамияти. Тухумдон захирасини сақлашда операциянинг ўзи билан бир қаторда гемостаз усули ҳам муҳим аҳамиятга эга. Paik va Jee (2024) 1435 бемор иштирок этган 14 та тадқиқот маълумотларини таҳлил қилиб, кистэктомиядан кейин биполяр коагуляция ва тикиш усуллариининг АМНга таъсирини солиштирган. Муаллифлар ҳар икки усулда ҳам операциядан кейин АМН пасайиши мумкинлигини, аммо 12 ойда тикиш усулида АМН кўрсаткичлари биполяр коагуляцияга нисбатан юқорироқ бўлганини қайд этганлар. Бу маълумотлар эндометриомэктомияда гемостазни таъминлаш учун термик таъсирни минималлаштиришнинг эҳтимолий аҳамиятини кўрсатади. Бироқ ушбу ёндашувларнинг клиник устунлиги ҳали ҳам барча беморлар учун бир хил даражада исботланган деб бўлмайди.

2026 йилда эълон қилинган тармоқ meta-ta'hlil янада кенг маълумотларни тақдим этди. Унда 21 та рандомизацияланган тадқиқот ва

1519 нафар бемор иштирок этган бўлиб, саккиз хил жарроҳлик стратегияси солиштирилган. Тадқиқотда гемостатик воситалар билан дренаж ва тикиш билан бажарилган кистэктомияда 3–6 ойлик даврда АМН пасайиши кистэктомиянинг ўзига нисбатан камроқ бўлиши мумкинлиги кўрсатилган. Лазер абляциясида эса АФС юқориноқ сақланган. Муаллифлар бироқ ушбу натижаларни узок муддатли фертилик ва рецидив натижалари билан тасдиқлаш учун қўшимча тадқиқотлар зарурлигини таъкидлаганлар. Шунинг учун мазкур технологиялар ҳозирча истиқболли орган-сақловчи стратегиялар сифатида баҳоланиши, аммо уларни барча беморлар учун универсал стандарт сифатида қабул қилишдан олдин узок муддатли натижалар ўрганилиши лозим.

Эндометриоманинг ўлчами ва операциядан кейинги тухумдон захираси. Эндометриоманинг ҳажми ҳам операциядан кейинги тухумдон захирасига таъсир қилувчи омиллардан бири бўлиши мумкин. Liu ва ҳаммуаллифлар (2025) 603 нафар бемор иштирок этган 7 та тадқиқотни мета-таҳлил қилиб, катта эндометриомаларда операциядан кейинги АМН пасайиши кичик эндометриомаларга нисбатан яққолроқ бўлиши мумкинлигини кўрсатган. Айниқса, 5 см ва ундан катта эндометриомаларда операциядан кейинги дастлабки даврда АМН даражаси пастроқ бўлган. Бу натижалар операциядан олдин эндометриоманинг нафақат мавжудлиги, балки унинг ўлчами, бир ёки икки томонлама жойлашуви ва тухумдон захирасининг дастлабки ҳолатини ҳам баҳолаш зарурлигини кўрсатади [4,6,12].

Эндометриозда гормонал терапиянинг ўрни. Эндометриоз эстрогенга боғлиқ касаллик бўлганлиги сабабли гормонал терапия унинг клиник бошқарувида муҳим ўрин тутди. Прогестинлар, комбинацияланган гормонал контрацептивлар ва GnRH аналоглари эндометриозга боғлиқ оғрик синдроми ва рецидивни назорат қилишда қўлланилади.

Vercellini ва Buffo (2024) замонавий даволашни беморнинг асосий симптоми, ёши, тухумдон захираси, қисқа муддатда ҳомиладорлик режаси ва

эндометриоз фенотипига асосланган ҳолда индивидуаллаштириш зарурлигини таъкидлайдилар. Муаллифлар прогестинлар ва узлуксиз комбинацияланган гормонал контрацептивларни узок муддатли симптоматик назоратда муҳим вариантлар сифатида кўрсатганлар. Бироқ гормонал терапиянинг муҳим хусусиятини тўғри тушуниш лозим: у эндометриоз билан боғлиқ бепуштликни мустақил равишда даволайдиган усул эмас. ESHRE тавсияларида бепуштликка дуч келган эндометриозли аёлларда тухумдон супрессиясини ҳомиладорлик эҳтимолини ошириш мақсадида қўллаш тавсия этилмайди. Агар бемор яқин вақтда ҳомиладорликни режалаштирмаса, гормонал терапия оғриқ ва рецидивни назорат қилиш учун қўлланиши мумкин. Демак, гормонал терапиянинг мақсади ва репродуктив стратегиядаги ўрни беморнинг ҳомиладорликка бўлган режаси билан мувофиқлаштирилиши керак.

Эндометриозда ёрдамчи репродуктив технологиялар. Эндометриоз билан боғлиқ бепуштликни даволашда IVF ва ICSI технологиялари муҳим ўрин эгаллайди. Бироқ эндометриозли беморларда назоратли овариал стимуляцияга жавоб, ооцитлар сони ва айрим ҳолатларда эмбрион кўрсаткичлари ўзгариши мумкин.

Garcia-Velasco (2024) эндометриозли беморларда IVF натижалари бўйича обзор ўтказиб, ушбу беморларда тухумдон захираси пасайиши ва ооцитлар ҳамда эмбрионлар сифати билан боғлиқ муаммолар учраши мумкинлигини таъкидлаганлар. Муаллифлар GnRH агонистлари билан узок муддатли олдиндан супрессия IVF натижаларини яхшилаши ишончли исботланмаганини, GnRH агонистлари ва антагонистларининг назоратли стимуляцияда натижалари ўхшаш бўлиши мумкинлигини қайд этганлар. Шу билан бирга, эндометриомани IVFдан олдин рутин жарроҳлик йўли билан олиб ташлаш масаласи қайта кўриб чиқилмоқда. ESHRE тавсияларига кўра, эндометриомани IVFдан олдин фақат тирик туғилиш кўрсаткичини яхшилаш мақсадида операция қилиш тавсия этилмайди, чунки мавжуд далилларда аниқ репродуктив фойда кўрсатилмаган ва операция тухумдон захирасига

салбий таъсир қилиши мумкин. Жарроҳлик асосан кучли оғриқ, эндометриоманинг фолликулаларга киришни қийинлаштириши ёки бошқа клиник кўрсатмалар бўлганда кўриб чиқилади. Бу ёндашув замонавий репродуктив тиббиётда муҳим парадигма ўзгаришини ифодалайди: операциянинг ўзи мақсад эмас, балки бемор учун энг мақбул репродуктив натижага эришиш воситаси ҳисобланади [5,7].

Ооцитларни криоконсервация қилиш. Эндометриозда фертилликни сақлашнинг энг кўп муҳокама қилинаётган усулларида бири ооцитларни криоконсервация қилишдир. Собо ва ҳаммуаллифлар эндометриозли аёлларда ооцитларни криоконсервация қилиш имкониятини ўрганиб, айниқса ёш беморларда ва тухумдон захираси ҳали сақланган даврда ооцитларни сақлаш келажакдаги репродуктив имкониятларни кенгайтириши мумкинлигини кўрсатганлар. Бироқ эндометриознинг ўзи барча беморларда мажбурий равишда ооцитларни музлатиш учун кўрсатма бўла олмайди. ESHRE 2022 қўлланмасида кенг тарқалган тухумдон эндометриозда фертилликни сақлашнинг афзалликлари ва чекловларини бемор билан муҳокама қилиш тавсия этилган. Бунда мазкур стратегиянинг барча беморларда келажакдаги тирик туғилишни ошириш даражаси ҳали аниқ эмаслиги қайд этилган.

Николй ва ҳаммуаллифлар (2025) ооцит криоконсервацияси бўйича 10 та кузатув тадқиқотини қамраб олган систематик шарҳни эълон қилдилар. Уларда ооцит олиш вақтидаги ёшнинг катталашиши ва эндометриоз бўйича аввалги жарроҳлик амалиёти олинган ооцитлар умумий сонининг камайиши билан боғлиқ бўлган. Шу билан бирга, ооцитларнинг етилиш даражаси аввалги операция тарихи билан аниқ боғлиқ бўлмаган. Муаллифлар криоконсервация қилинган ооцитлардан кейинги ҳақиқий фойдаланиш ва тирик туғилиш натижалари ҳақидаги маълумотлар ҳали етарли эмаслигини таъкидлаганлар.

Шунинг учун фертилликни сақлашда энг муҳим принциплардан бири — кечиктирилган эмас, эрта репродуктив маслаҳат ҳисобланади.

Фертилликни сақлашга индивидуал ёндашув. Эндометриозда фертилликни сақлаш стратегиясини барча беморларга бир хил қўллаш мақсадга мувофиқ эмас. Бундай қарор бир нечта омиллар асосида қабул қилиниши лозим:

- беморнинг ёши;
- АМН даражаси;
- AFC кўрсаткичи;
- эндометриоманинг бир ёки икки томонлама жойлашуви;
- эндометриоманинг ўлчами;
- аввалги тухумдон операциялари;
- рецидив мавжудлиги;
- ягона функционал тухумдон мавжудлиги;
- ҳомиладорликни режалаштириш муддати;
- эндометриознинг клиник оғирлиги;
- оғриқ синдромининг даражаси.

Айниқса, икки томонлама эндометриома, такрорий жарроҳлик ёки тухумдон захирасининг пасайиши кузатилганда репродуктолог иштирокида фертилликни сақлаш имкониятларини эрта муҳокама қилиш муҳим. Бундай ёндашувда беморга фақат «операция керак» ёки «операция керак эмас» деган қараш билан ёндашиш етарли эмас. Беморнинг репродуктив келажаги, тухумдон захираси ва касалликнинг клиник фаоллиги биргаликда баҳоланиши зарур.

Янги ва истиқболли терапевтик йўналишлар. Эндометриозни даволашда янги фармакологик ёндашувлар ҳам ривожланмоқда. Хусусан, GnRH антагонистлари орасида элаголикс ва релуголикс каби препаратлар эндометриозга боғлиқ оғриқ синдромини назорат қилиш имкониятлари нуктаи назаридан ўрганилган.

Бироқ янги гормонал препаратларнинг асосий мақсади эндометриоз ўчоқларини назорат қилиш ва симптомларни камайитириш бўлиб, уларни тухумдон захирасини тикловчи ёки фертилликни сақловчи восита сифатида

баҳолаш ҳозирча тўғри эмас.

Vercellini ва Buffo (2024) таъкидлаганидек, эндометриоз терапиясининг замонавий концепцияси касалликнинг эстрогенга боғлиқлиги ва прогестеронга нисбатан резистентлигини ҳисобга олган ҳолда индивидуал гормонал супрессияга асосланади. Шу билан бирга, янги препаратларнинг узоқ муддатли хавфсизлиги, репродуктив натижалари ва тухумдон захирасига таъсири бўйича қўшимча маълумотлар талаб этилади. Келажакда эндометриознинг иммунологик, яллиғланиш ва молекуляр механизмларига қаратилган даволаш усуллари ҳам ривожланиши мумкин. Бироқ экспериментал ёки клиник синов босқичидаги усулларни стандарт терапиядан фарқлаш муҳим.

Муаммонинг замонавий концепцияси. Юқоридаги маълумотларни умумлаштирганда, эндометриоз ва тухумдон захираси ўртасидаги муносабатни ўрта асосий босқичда кўриб чиқиш мумкин.

Биринчи босқич — эндометриознинг ўзига боғлиқ тухумдон зарарланиши. Бунда сурункали яллиғланиш, оксидловчи стресс, эндометриома муҳити ва фиброз жараёнлари муҳим аҳамиятга эга.

Иккинчи босқич — жарроҳликка боғлиқ тухумдон захираси йўқотилиши. Кистэктомия вақтида функционал тухумдон тўқимасининг зарарланиши ва электрокоагуляциянинг термик таъсири АМН ва AFC пасайишига олиб келиши мумкин.

Учинчи босқич — такрорий операциялар ва репродуктив вақтнинг қисқариши. Эндометриоз рецидивланганда қайта операция қилиш эҳтимоли пайдо бўлади. Агар беморда дастлабки тухумдон захираси ҳам паст бўлса, ҳар бир кейинги жарроҳлик аралашуви репродуктив потенциалга қўшимча таъсир кўрсатиши мумкин. Шунинг учун эндометриозни даволашда «касалликни бартараф этиш» тушунчаси «тухумдон функциясини максимал сақлаш» тушунчаси билан биргаликда қаралиши лозим.

Муҳокама. Замонавий адабиётлар эндометриоз ва тухумдон захираси ўртасида мураккаб икки томонлама муносабат мавжудлигини кўрсатмоқда.

Бир томондан, эндометриомаларнинг ўзи тухумдон тўқимасида патофизиологик ўзгаришларни келтириб чиқариши мумкин. Иккинчи томондан, уларни жарроҳлик йўли билан даволаш тухумдон захирасига қўшимча зарар етказиши эҳтимолига эга. Бу масалада АМН муҳим биомаркер бўлса-да, унинг пастлиги автоматик равишда табиий ҳомиладорлик имконияти йўқлигини англатмайди. Шунинг учун клиник қарор фақат битта лаборатор кўрсаткич асосида қабул қилинмаслиги лозим. 2024–2026 йиллардаги мета-таҳлиллар жарроҳлик техникасининг тухумдон захирасига таъсирида фарқлар бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Абляция, лазер технологиялари, тикиш ва гемостатик воситалар айрим тадқиқотларда АМН ёки АФСни нисбатан яхшироқ сақлаган. Бироқ уларнинг рецидив, табиий ҳомиладорлик ва тирик туғилишга таъсири бўйича натижалар бир хил эмас.

Шунинг учун келажақдаги тадқиқотлар фақат АМН ўзгаришини эмас, балки кумулятив тирик туғилиш, ооцитлар сони, эмбрион сифати, эндометриома рецидиви ва беморнинг узок муддатли репродуктив натижаларини баҳолаши лозим.

Бу айниқса фертилликни сақлаш технологияларига тааллуқли. 2025 йилги систематик шарҳда ооцит криоконсервацияси бўйича мавжуд тадқиқотлар асосан кузатув характерида бўлиб, ооцитларни кейинчалик ишлатиш ва тирик туғилиш бўйича маълумотлар ҳали чеклангани кўрсатилган.

Шундай қилиб, эндометриозли беморда репродуктив стратегияни танлашда «операциядан кейин фертилликни сақлаш» эмас, балки операциягача репродуктив хавфни баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Икки томонлама эндометриома, паст АМН, аввалги операциялар ёки такрорий операция эҳтимоли мавжуд бўлганда ооцит ёки эмбрион криоконсервацияси имкониятлари репродуктолог билан муҳокама қилинади.

Эндометриоз билан боғлиқ тухумдон захирасининг камайиши репродуктив тиббиётда долзарб клиник муаммолардан бири ҳисобланади.

Тухумдон захирасининг пасайиши касалликнинг ўзига хос яллиғланиш ва оксидловчи стресс механизмлари билан бир қаторда эндометриомани жарроҳлик даволаш натижасида ҳам юзага келиши мумкин. АМН ва AFC эндометриозли беморларни репродуктив нуқтаи назардан баҳолашда муҳим кўрсаткичлар бўлиб, уларни беморнинг ёши, эндометриоз фенотипи ва репродуктив режалари билан биргаликда талқин қилиш лозим.

Сўнгги йиллардаги тадқиқотлар эндометриомада жарроҳлик техникасини танлашнинг тухумдон захираси учун муҳимлигини кўрсатмоқда. Кистэктомиядан кейин АМН пасайиши кузатилиши мумкин, айрим маълумотларда лазер абляцияси, тикиш ва гемостатик воситалар билан орган-сақловчи ёндашувлар тухумдон захирасини нисбатан яхшироқ сақлаши мумкинлиги кўрсатилган. Бироқ мазкур усулларнинг узок муддатли фертиллиқ ва рецидивга таъсири бўйича далиллар ҳали етарли эмас. Гормонал терапия эндометриознинг оғриқ ва рецидивини назорат қилишда муҳим аҳамиятга эга, аммо у эндометриозга боғлиқ бепуштликни даволаш мақсадида тухумдон супрессиясининг ўрнини босмайди. Ҳомиладорликни яқин вақтда режалаштирмаётган беморларда гормонал терапия касаллик фаоллигини назорат қилиш учун муҳим вариант бўлиши мумкин.

Фертиллиқни сақлаш нуқтаи назаридан эса энг муҳим ёндашув — беморни операциядан кейин эмас, операциядан олдин репродуктив хавф нуқтаи назаридан баҳолашдир. Айниқса, икки томонлама эндометриома, паст АМН, аввалги операция ва такрорий жарроҳлик эҳтимоли мавжуд беморларда ооцит криоконсервацияси масаласини эрта муҳокама қилиш мумкин. Николі ва ҳаммуаллифлар (2025) таъкидлаганидек, ооцит криоконсервацияси эндометриозли беморларда истиқболли стратегия бўлса-да, унинг барча беморларда келажакдаги тирик туғилишни оширишини тасдиқловчи юқори даражали далиллар ҳали етарли эмас.

Хулоса. Шундай қилиб, эндометриозда замонавий терапевтик парадигма «эндометриоз ўчоғини бартараф этиш»дан «касалликни назорат қилиш+ тухумдон захирасини асраш+репродуктив потенциални сақлаш»

концепциясига ўтиб бормоқда. Ушбу ёндашув беморнинг ёши, тухумдон захираси, эндометриознинг фенотиби, клиник симптомлари ва репродуктив режаларини бирлаштирган ҳолда индивидуал даволаш стратегиясини ишлаб чиқишни талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Becker C.M., Bokor A., Heikinheimo O. et al. ESHRE guideline: endometriosis. *Human Reproduction Open*. 2022;2022(2):hoac009.
2. Zondervan K.T., Becker C.M., Missmer S.A. Endometriosis. *New England Journal of Medicine*. 2020;382:1244–1256.
3. Vercellini P., Buffo C. Update on Medical Treatment of Endometriosis: New Drugs or New Therapeutic Approaches? *Gynecologic and Obstetric Investigation*. 2024.
4. Goyri E., Kohls G., Garcia-Velasco J. IVF stimulation protocols and outcomes in women with endometriosis. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. 2024;92:102429.
5. Paik H., Jee B.C. Impact of Ablation Versus Cystectomy for Endometrioma on Ovarian Reserve, Recurrence, and Pregnancy: An Updated Meta-Analysis. *Reproductive Sciences*. 2024;31(7):1924–1935.
6. Paik H., Jee B.C. Comparison of ovarian reserve after cystectomy of ovarian endometrioma by bipolar coagulation, suture method, or hemostatic sealants: An updated meta-analysis. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*. 2024;50(6):1020–1031.
7. Liu Y. et al. Comparison of ovarian reserve after laparoscopic cystectomy in patients with ovarian endometriosis differing in cyst size: a systematic review and meta-analysis. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. 2025.
8. Nicolì P., Viganò P., Saccone G. et al. Oocyte cryopreservation for patients with endometriosis: where are we now? A systematic review. *Reproductive BioMedicine Online*. 2025;51(1):104839.

9. Liao L., Pan Z., Li Y. Endometriosis as a risk factor: impact on IVF outcomes and reproductive parameters: a systematic review and meta-analysis. *Archives of Gynecology and Obstetrics*. 2025;312:1085–1093.
10. Korean Society of Endometriosis. Clinical evaluation and management of endometriosis: 2024 guideline for Korean patients. 2024.
11. Paik H., Jee B.C. et al. Comparative effect of different surgical treatments for ovarian endometrioma on anti-Müllerian hormone levels: a systematic review and network meta-analysis. *Human Reproduction Open*. 2026;2026(3):hoag019.
12. ESHRE Guideline Group. Female fertility preservation guideline. *Human Reproduction Open*. 2020.
13. Cobo A. et al. Oocyte vitrification for fertility preservation in women with endometriosis. *Fertility and Sterility*. 2020.
14. Chapron C., Marcellin L., Borghese B., Santulli P. Rethinking mechanisms, diagnosis and management of endometriosis. *Nature Reviews Endocrinology*. 2019;15:666–682.